## 庫全書

子部

欽定四庫

證治準鄉卷一百十三

編修臣倉聖服覆勘 **群校官太陽院醫士 臣舒 岱** 總校官進士 臣朱

校對官典簿臣 腾绿監生 臣饒文洲 郭祚熾 鈴 灰足り取 推治學題 其狀不大初從小指於急 其狀大癰不急治之百 王肯堂 撰

色赤腫痛而潰膿者屬濕熱下注為可治若色微赤 治去之具狀黑者不可消鼽益不治百日死 腫 以行壅滯助陽氣更用十全大補湯八味九壯脾胃 "湯六味九以補精氣岩色點不痛者看肉灸桑枝灸 濕熱下注者先用隔蒜灸活命飲以解壅毒次服益 而腺清者屬精血虧損為難治若黑點不腫痛不潰 證屬足三陰經精血虧損或足三陽經濕熱下注岩 煩熱作渴小便淋漓者陰敗末傳惡證也為不治 表 辞鄉 其 微 發

金少日

其痛頓止灸患處出水赤腫頓消次用托東消毒散 ここの時人は 六味地黄九補中益氣湯愈 化源多有復生者若專治其瘡復傷元氣吾未見其生 )藥不應服除濕之劑益甚余以為陰虛濕熱下注用 此足三陽經陰虚濕熱下注用隔縣灸托東散而 矣患處出膿而愈 痛此足三陽經濕熱下注先用隔蒜灸活命飲 閣老新介卷脚指縫作痒出水腫城脚面數止痒 溢治學屬 儒者楊舉元惠此微腫痛徵赤 大然李北溪左足赤 四

釗 损 歛 31 為外寒所侵用大防風湯及十全大補兼服而 用十全大補湯而膿成又與加減八味九料百劑 屋不利飲食勞倦前症復作盗汗內熱飲食不化 肌瘦 足三陰虧損前藥復傷脾胃也先用六君加炮薑 飲或用四物孝連黃檗知母董腹痛作嘔煩熱大 百餘劑喜其年此得愈 兆 儒者患此腫硬色白兩月餘矣此足三陰經 胖土虚寒而命門大不能相生用八味 百十 男子脚心於熱作 消 朽 便 而

H

Ľ

Ĵ

たらり 日人はす 腿 證愈 滋 虚而水泛為痰也服益氣湯六味九年餘元氣復而諸 以加減八味九東服半載而愈 痒以滾湯浸漬溃而出水肌體骨立作渴吐痰此脾腎 即輕瘡出血水數日而消瘡色仍點時公將北行質 化源以杜後患彼雖然之而然不服次年九月內左 面患疽色點不痛脚腿沉重用隔蒜灸三十餘壯足 胖胃醒再用補中益魚加茯苓半夏而胖胃健 少宗伯顧東江面繁作渴余曰此肾經虧損當 经治準繩 儒者脚心發熱作

重ジュ 祝萬壽余診之曰脾脉良懲陽氣虚極不宜遠行公曰 堂病為數曰立齊直能留我果卒於此亦異數也 余得夢屢驗向夢羣仙待我此壽徵也至河間驛聚仙 黑者不死治之不哀急斬之否則死矣 靈樞云發於足指名曰脱癰其狀亦黑者死不治不亦 堪未過節者可治 疽發兩足指五日不冗死四日可刺其色發黑癰者不 脱疽 足指生疗重者溃而自脱故曰脱 卷一百十 į 鬼遺云塵敦

疽或曰惟足大指患之為脱疽其餘足指患之曰敦疽 除濕攻毒更以隔蒜矣之至不痛用十二經消毒散 九三日日 在日 用 易治惟脱疽難治 氟治之劾 汁塗傳又以萬病解毒九磨醋煖塗之 及以柴河車金線釣葫蘆金雞舌金腦香搖爛敷及 解毒以消毒萬全湯臨證加減 經樂者腫勢盛未得緊急者宜作蛇傷治之及作 未成账痛或不痛或大痛者宜隔恭灸更 初發結毒城赤腫痛者以五神散 遊冶準編 未成岩色黑急割 未成焮痛者

焮痛者托裹消毒更兼灸以人参败毒散去桔梗加赤 通因醇酒炙燒膏梁傷胖或房勞損野故有先遇而後 敗毒散加赤牛膝銀花白芷大黄次以活命飲 速服補劑無可救者黑涎上不可治 成欲成大痛色赤而腫隔蒜炙至痛止以加味荆芥 知痛又明矣之 膝銀花白芷大黄痛止次以十宣散加天花粉金銀 未成欲成若色紫不痛隔蒜灸五十肚尚 活命飲次以托裏散潰脱而愈 未成岩色赤

金少世月日言

一 百十三

欠已四百七時 **氣虚弱或犯房事外塗寒凉內服尅伐损傷脾胃患處** 虧損無可保生亦有因修手足口咬等傷而致者若元 色黯不痛者腎魚敗而虚火盛也隔蒜灸桑枝灸亦用 隔蒜灸活命飲托稟散再用十全大補湯加減八味九 不潰若黒點上延亦多致死重者頂當以鄉刀轉解 不溃者不治色赤作痛者元氣虚而濕毒壅盛也先用 全大補湯加減八味九則毒氣不致上侵元氣不致 按治华經

患者有先患而後渴者岩色赤作痛自溃者可治色黑

**程梗官桂加天花粉數削而平** 內斷雖去而仍潰且偏僻之處魚血罕到樂難導達况 金グロルノニ 攻毒之劑先傷胖胃不若灸法為良重者湏解去為善 孫真人云在內則割在指則截益親之遺體雖不忍 去桔梗加金銀花白芷大黄二劑痛止又十宣散去 而遂至天殁則尤傷矣况解法無痛患者如之 报去之則筋隨骨出而毒得沒亦不痛否則 指患此城痛色赤發熱隔蒜灸之更以人 踰四十

赤而腫以人參敗毒散去人參桔梗加金銀花白芷大 去毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜其飲食如 散去桔梗桂加金銀花防已數劑愈 以敗毒散加金銀花白芷数劑而愈 指赤腫城痛此肾經積去下注而然名曰脱疽喜色 亦患此色紫黑脚城痛孫真人曰脱疽之證急斬之 ·痛隔蒜灸五十餘肚尚不痛人明灸百壯方知乃 **劇更以金銀花甘草節瓜薑四劑頓退再以十** 隆治準繩 膏梁年瑜 人患此色紫 宣

動息自寧為瘡善證遂以連翹敗毒散六劑更以金 背亦不治或先渴而後發或先 此精無已竭决不可治 房勞太過丹石補藥所致其簽于指徵亦而痛可治治 栗愈甚服八味儿而止 金銀花白出二十餘劑而愈次年忽發渴服生津等 不愈急斬去之庶可保否則不治色紫黑或發于 甘草節瓜婁二十餘劑患指溃脱更以芎歸生毕 易 羌左足指患一泡麻 抵此症皆由膏梁厚味 發而後渴色紫赤

多方ではる言

黑肉割後骨始痛可敢治以十全大補湯而愈益死肉 胃受毒所致進飛龍奪命丹 色赤次日指黑五日連足黑冷不知疼痛脉沉細此 風淫末疾是也向若及伐之則邪氣乗虚上侵必不 乃毒氣盛拒截柴魚所致况至陰之下血魚難達經云 ていず見 活命飲而痊 參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黄而潰更 1.1 4.1 (情患之大痛色赤而腫隔蒜炎之痛止 鞍治洋好 服翌日令割去足上 )黑不痛令明炎 Ł 双

銀分四月分書 至於此 **蒜灸五十餘壯尚不知痛又明炎百肚始痛更投仙方** 脉洪數而無力左尺為甚余謂此足三陰虚當滋化源 色赤焮痛作渴隔蒜灸敷壯以仙方活命飲三劑而潰 更服托裹樂及加減八味九漬脱而愈若早用前法 活命飲四割乃以托裹樂潰脱而愈 不信果延上遂致不赦 餘北而痛喜飲食如常子謂急割去之速服補劑 **膏梁之人先作渴足熱後足大指赤痛六** 卷一百十三 足指患之色紫不痛陽 环 村思之

欠足日東 合島 附方 五神散 用補中益氣湯夕用補陰八珍湯各三十餘劑及桑枝 灸潰而膿清作渇不止遂朝以前渴送加減八味丸夕 為主因服除濕敗毒等樂元氣益虚色黯延足余乃朝 用十全大補湯三十餘劑而產是時同患此證服敗毒 / 樂者俱不救 金線釣葫蘆 切廣毒蛇傷蝎螫大効 紫河車錢 经治草绳 --續隨子

金发口压台言 洗瘴方 唾調搽或加騎蛇獅子根葉同前搗用亦妙 肾主于脚若肾虚為風濕所博及於脚膝則名脚氣 為末醋調塗患處蛇傷以刀割去損內以末乾搽或以 香沙 連义大青 水苦齊 脚魚瘡 槐枝葉 煎藥水浸洗 卷一百十三 柳枝葉 嫩柏葉 小青葉

炎色四華台島 犀角散 毎服八銭水一中盞半 脚上生瘡也若風毒不散其瘡漸增黃水腫痛身體 因其氣血壅滞濕毒氣盛在於膚腠不得宣通故令 肚熱經久難瘥也 蘆白蒺藜 烏蛇酒浸 犀角屑 治脚氣風毒生瘡腫痛心神煩熱 天麻 黄芩 羌活去枳殼 生薑五片煎一大盞去滓温服不拘時 鞍治準繩 白鲜皮每七檳榔一甘草成牛 人程炒防風 黄茂春

金グロアノニ 漏蘆儿 右研為細末煉蜜和據二三百下九如桐子大每服三四 十九温酒送下不拘時 两各 漏蘆 樂各七鳥蛇四浸 治脚氣腿脫生瘡 防風 治脚氣腫盛生瘡久不瘥膿血長流疼痛 撫成 泥五味子 秦光在去歲 獨活 卷一百十三 黄茂春去黄本 积殼粒炒檳榔 五加皮

ふんれ ついる しょとか 治脚氣脚上生風毒瘡腫疼痛 又方 右等分酒糊和九梧子大每服三四十九温酒或鹽 湯 右研為細末每服二三錢煎荆芥湯調下空心日進二服 石每用五两水一斗者取六升去浑看冷熱無風處淋洗之 食前下次服後方 漏蘆 川芎 當歸 白斂 去蘆谷 視白皮 五加皮 甘草 每七英黎子三 鞍治洋 繩

**建恭散** 多丘匹戽全書 龍骨散 右研勻先以口含虀水或温鹽湯洗令瘡淨見肉却以真 **石各等分為細末摻之 胁油調藥隨瘡大小傅之未愈再傅三五日可** 白龍骨二錢輕粉二錢檳榔 存性研為細末五銭龍入火中燒今紅取出 竹蛀屑 氊焼灰 治脚疽并久遠惡瘡他藥無效者 治脚爛瘡 紅東姓存黄丹 研 發務養 新瓦上時一錢務務本 不以多少 白礬枯部粉

能成甲疽几以經絡之所流注非特肌肉之病也或得 氣血沮遏而不通腐溃為疽久則爛指上引於脛膝之 濯去恶而除穢及適其行復則愈矣 問而瘡疱者是已然病在四末不必治其內惟塗傳滌 於剪甲傷肌或得於甲長侵內或得於優約之不適便 足り年在野 下氣血易沮樂力難到虚弱之人小有破損 一陰經皆起於足指氣血沮而不行結於指甲之 甲疽 嵌 避治洋繩 按足指在 間

氣內攻診脉沉細止痛傷胃魚而然 遂剌之服六君 あいし口 而愈 俱東令取之服大補樂而愈 加藿香當歸食進更以八珍湯加黄送白芷桔梗 潰脈痛至手誤敷冷藥以致通潰飲食少思彼為毒 作痛潰膿而愈 四末不必治內非通論 久而不飲况其大者非大 八傷拇指色紫不痛服托裹藥及灸五十 幼女因凍傷兩足至春發潰指 也 Б 十三 /補氣血豈能易愈此云病 婦修甲傷次指成膿 女患战甲 月餘

**忠處使於內去陽氣至瘡口自合否則不治彼忽之不** 投以生血通經則可 養遂成死肉惟當壯脾胃行經絡生血氣則愈有成破 ンニューニュ 傷風以致牙關緊急口眼喎斜者先玉真散一 北 早治後變勞症而殁 不愈日出機數滴子謂足大指乃脾經發源之所宜矣 脱余曰此因陽氣虚不能運達於患處也速去之速 多因紫縛致血脉不通或被風邪所襲則無血氣樂 益至陰之下血氣難到女人患 隆治準繩 男子修傷足指色黑不痛 一服

若成其元氣邪氣愈甚潰爛延上必死不潰而色點者 **泡聚四邊起如火烧瘡口日夜倍增醫方所不能療者** 四邊腫焮黄水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上脚跌 甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復緣穿窄軟研損 亦死若骨斷筋皮尚連者急剪去之精要治甲疽因剔 爛 緑礬五兩形色似朴硝而緑色置於鐵板上聚炭封 上脛而死大抵手足氣血罕到之地或生瘡或傷損 動力四月全書

服補劑以北元氣否則死內延足必不救矣不信果黑

大三日 日本 鹽湯洗瘡帛拭乾用此末傅之愈 聖惠蝦蟆散 候沸定汁盡去久待冷取出研細色似黄丹収之先 |吹令火熾其器即沸流出色赤如鎔金汁者是真也 前湯 相和研勻以臘豬脂調如膏先以甘草蛇床槐白皮 蝦蟆灰 半线杏仁研如泥 鹿角七寸燒透掛蛇膽半 两黄連 抵乾傅藥以油單 紙裹外更着綿帛裹之 治甲疽皮厚腫痛 大服粉谷 麝香研雄黄 研枯白礬 谁冶準絕 +=

猪蹄湯 金万山石石香 白礬散 右為㕮咀先以水三斗煮豬蹄至一斗五升候温洗 瘡拭乾軟藥愈 **搓者努內裏甲疼痛出血不定用此縮內乾瘡** 豬蹄二隻白斂 日其利內利甲皆當自落三日 黄芩 治男女血風毒氣攻手足指生甲疽瘡久不 治甲疽及諸癰疽惡瘡有息肉 大黄 白芷 獨活系 卷一百十三 狼牙 **芍藥略三黃連** 换

九三可良 二方 馬齒散 白礬散 换之 右以漿水洗瘡乾傅之洗瘡日三兩上以瘥為度 將白礬石膽於鐵器內以炭火煅過入後三味同研令 細每用少許乾掺瘡上以絹帛子纏定日兩三度 白礬 白礬焼灰麝香 蘆薈 治甲疽 治甲疽 石膽 \*麝香 遊沿潭鄉 騏驎竭 蚺蛇膽る 朱紅谷 細牛 分 十四

**到员四周全**重 簡如膏 祖以塗瘡上日三兩度其赤內即消散 右吹咀苦酒浸一宿與豬脂一處微火上煎取二合紋去 除丹砂鹽外對碎拌与於熨斗內以皮灰火燒過取出 度 細研即以丹砂鹽末再炒令勺旋取傳瘡上日三兩 艦上馬齒莧 四 敢木香 簡鉛 治甲疽日夜培增赤肉生甲邊東甲者 黄茂 四二豬脂 4 丹砂研鹽不知矣用

欠足可事在時 緑礬散成治甲疽 蛇黄散海上治甲疽腫爛生脚指甲過赤肉努出時瘥 時發又治嵌甲生入內常血疼痛 右緑礬半兩燒熟蘆薈二錢半麝一匙各研如粉用絹 用雄黄半兩蛇蜕一分燒 同研如粉先以温泔洗瘡 袋盛藥納所患處指袋中綿紮定瘥為度 日許藥温即易一日即除痛便止一方用漿水洗淨 上軟以尖刀子割去甲角拭乾藥傳上用軟帛裹半 超治单级 **十** 

多いでたん 乳香傅方 八蝎散 **湏是别去甲不樂亦愈或已成瘡久不瘥即用此方** 用乳香膽礬各等分研細末時時傅之 以橘刺破 右用牡蠣頭煅研末每服二錢研散花酒調下 服 二味焼灰為末傅之一方用礬焼灰傅瘡 治甲疽 治甲疽努肉果甲腺血疼痛不瘥 方有黄送無雄黄 卷 E

大七四年上四 烏梅散 丹我甲陷甲割甲成瘡久年不瘥者用黄檗烏頭尖等 事蛇治嵌甲累劲方 又方用鹽梅焼灰傅爛搗裹亦可 右研為末以生麻油調先以鹽湯洗淨挹乾傅之二次 右用烏梅十枚烧灰研為嵌傅瘡上日三易 分為末洗净貼之 硇砂 治甲疽多年不瘥多肉腺血疼痛 乳香在一致服粉與橄欖核燒存性黃丹一 经治单继

砂糖方 重 没散 5 即效 用紫馬養三瑰各青布一片包了於新元上炭火煅 麝香麻油傅 山寺丞方云治嵌甲别生及無他病者無所損神 右用琥珀糖是砂糖熬成小毬兒者烧存性入輕 存性研細末每半兩入沒樂拾文輕粉拾文麝香少 ルノニー 治战甲 治战甲 甲嵌入肉者不過 一百十三 兩日自爛陳仲

大山田里 仙子 烏倍散百一 用只取五倍子為末瘡乾用麻油調塗濕即乾貼 不効一 痛不過三次即去根本昔有人患此二十五年百藥 先將上三物槌碎同炒五倍子令焦黑色去三物不 許先以惹椒湯洗拭乾口含甘草漿水吐在瘡上再 洗拭净傳樂濕者乾搽乾者生油調塗初貼一 草鳥頭畔白牵牛而五倍子四兩龍骨二线 傅而安 冶嵌甲 燈治草属

香胭脂散 多グロガる言 右研為細末搽患處愈 瘡上兩日一次愈 右研為細末用水洗瘡令淨軟帛拭乾以新汲水調 黄連 五倍子焼黑染胭脂分等麝香少 麝香散百一一名 治畝甲 部粉 治嵌甲 黄檗 治嵌甲侵肉不瘥 百十三

とこうえ ここう 陀僧散 黄芪方 右研為末貼瘡上若有惡肉更研少許硫黄末同貼 右研為末乾搽帛裹之亦治脚臭一方用硇砂不用陀僧 右研和匀濕者乾搽乾者用津入輕粉少許調塗 黄芪 雄黄通明蟬退三枚酥炙 白礬羅蜜陀僧分等 治陷甲生入肉常有血疼痛 治割甲侵肉不瘥 當歸分等 登台車

盡水駐車九 多方四母全書 治族甲 香散 次用剪子去之 石產水口鳴净洗却用駐車九研細傳之 治欲去甲者用綿逐旋相 冶嵌甲用乳香研細茶之 治战甲痛不可忍有妨步負 **以鴉嘴膽礬為末搽之** 香那乳香或古半两錢 獎輕粉好度 治战甲腺出痛不可忍 百十二二 甲内渐添之級 病方沸見 下雅

指甲用藥乾貼縫內或用麻油調傅 研為末次入青黛一處研勻先用葱鹽湯 **挹氧然後傅樂即以燈草塞之** 末細絹羅過每用少許先以甘 **訶子松降真香** 1:15 治嵌甲 治嵌甲 流膿經久不瘥 二味 **州五倍子 畔 浔剪去** 

銀灰四届全書 應散 **看靴復脚指濕爛婦** 石白礬焼汁盡取未着瘡中 去甲角旬日即蹇加雄黄少 **脚指縫爛瘡鶴堂** 石以葱鹽湯洗浄患處挹乾傳藥少許 脚指縫爛瘡 跗發 治足大指角急為甲所入肉便刺作瘡不 卷一百十三 人有此 許同研榜之 食惡肉生好內細細 桐油 奎 可

**长之四車全書** 膿稠可治膿清紫陷者死 消毒樂而愈 肉桂牛膝及隔蒜灸之繼以十全大補湯托熏温中 胃經之會多因濕熱垂虚而下注宜服活命飲加木瓜 鬼遺云陽疽初足跌及足下二十日不冗死十日可刺 隔蒜灸三十餘壯痛止以活命飲四劑而潰更以托熏 足面也其處結毒腫痛亦名足發背屬足厥陰肝陽明 發赤白膿血不多其瘡上痒及赤黑者死 人脚背患之色點而不腫痛煩躁大 題治準繩 人脚背患此赤腫作痛 跗亦作趺 渴

每歲 固 氏年六十左足面一瘡下連大指上延外踝以至賺 如泉流呻吟痛楚殆不可忍夜分即漸已明 更樂則瘡轉大而劇百試不驗如是二十餘年淳 亦坐因而發嘆 無計困極就睡夢四神僧點出一 **戾仲冬之末先生為太府丞一** 軌數發發必兼旬果月昏暮痒甚抓撥移時出 **脉大而溢此精氣已絕不治後** 僧問其故子固答之以實僧云 夕母病大作相 室傍有一 趙子固母 日復然每 長榻 血

大三日東 白年 塞所用斗黃龍腦膩粉金箔之類皆非老人所宜今 取奇效意熱積騰腑而發於皮膚歲久根深未易洗 夢者而記其事金虎丹出和剧局方本治中風痰涎 病自此迷愈殊砂之說竟不復試先生因**圖僧像如** 藥半粒强服之良久天痛舉家相泣且悔俄而下碼 假凉劑以及之不可以常論神僧之夢益孝感云 如鐵石者數升是夕瘡但微痒不痛而無血數日成 牛黄金虎丹又 僧云硃砂亦可既覺頗驚異武 強治準繩 Ī 滌 砚

金少世是台灣 服一九新汲水化下有孕婦不可服 右為細末煉蜜搜和每一两半作十九以金箔為衣每 黄金虎丹 雞屎子 牛黄研上龍路生研膩粉研二十 十五两金箔 五天南星 治足蜘蛛背 詐死子 作餅陰乾無牛膽用法酒蒸七重夜研湯洗焙二十五兩研末用牛膽汁和 為八 衣十 卷一百十三 兩面龜 十二兩半一人一大大大 赤牛膝 雄黄五研 紫金皮 豣 十两 飛一百 白

大足可馬白馬 敷藥方 蜈蚣 背子蜈蚣 蜈蚣 大蕎麥 地燈心砍爛縛之 金雞舌砍爛縛之 天南星 用水煎入酒和服 凌霄根 鹿葱根 同砍爛入些醋暖塗敷 赤葛根 脱殼藤 紫金皮 發治平極 雞屎子 山布瓜 苦薄荷 天布瓜 天布瓜根 凌霄根 产 背

角写正正白言 右用羊糞二三十粒 留瓦上四畔炭火烧烟住火 鉗于地上以養覆存性羅成白灰研 沙土麻油調敷痒 不問乾濕痛痒日近年深百樂不蹇者 紫鼈蘇橘酒服以查敷卷處 跟疽 治脚面恶瘡 瓜根砍爛酒炒數之 **人輕粉痛** 如桐 油浸淫延漫及治 麝香少許 細以炒片節去 攰 筋 惡

烏金散紫金丹選用若紫陷麻木神昏脉亂者不治過 敷贴宜隔蒜灸之及服活命飲加牛膝肉桂或勝金丹 為名屬足太陽經元名申脉在足跟骨下此處乃陰陽 政問足跟生疽何如曰是名兎齧以其狀若兎齧故 くこうえ **潰爛者有妨飲食二** 婚發源之所由歲府積熱所致其毒深重最思毒樂 薛足跟乃督脉發源之所腎經所過之地若飲食 居失宜虧損足三陽經則成瘡矣若漫腫寒熱 7:17 便不調或涉房勞怒無迷問者 经冶准绳 至

多点 升或 此皆當滋其化源若治其外 體俸少食屬脾虚下陷也用補中益魚湯若晴 頭目不清屬脾虚陰人也前湯并六味九若痰 如無皮忽如皴裂日明至夜脹痛焮熱用補中 四母全書 被鬼咬足跟久而 口舌生瘡屬野水乾酒也前 兩腿酸軟或赤或白足 補其肝肾而愈 基: 不飲氣血涯盡而死 一百十三 跟患腫或痛或痒後痛 則誤矣俗云東墙瘡者益 湯并加減八味 男子足跟作 热 益魚 涎

たこりを上上日 當歸膏兩月餘而愈其服消毒等藥而沒者不能枚 毒清熱潰裂番張狀如赤榴熱痛如錐內熱哺熱此 加減 除濕之劑更加發腫又服敗毒之樂账赤痛甚恪用祛 內熱引飲作渴體倦兩足發熱後足跟作痛或用清熱 渴體倦小便 族咳嗽此足三 | 陰虧損朝用十全大補湯夕用加減八味九外敷 八味九各五十餘劑而愈 如林 一陰虧損而樂復傷余用十全人補 用敗毒散致頭痛惡寒欲唱不 経治準經 男子素不慎起 吉 凶 湯

體 石愈 愈其不信患疽以攻不起者多矣 更 多月日居 人 謂此足三陰虧損防患疽不信反服清熱化痰之樂 骨立自分必死余用十全大補加山菜山藥两月餘 加明熱頭軍又 男子亦患此服消毒散操追蝕藥虚症疊出其形 小面發疽余用補中益魚六味地黃九百餘服 痛甚狀似傷寒以選少丹內塞散治之稍可次因 膏粱之人 服四物黄檗知母日明熱甚飲食 兩足發熱作湯左尺脉數而無 卷一百 人脚跟生毒 澌

たとり時心に 海蔵云足跟瘡久不愈毒氣攻注用白术一味為細末 于虚復不知戒雖大補氣血循恐不及安服攻毒暴悍 不能發生肾氣由此而泄故為終身之疾況彼瘡先得 · 藥以脫賊乎 人足跟足 以鹽漿水温洗乾貼之二日 乃二為發源之處腎經所由之地瘡口不合則獨氣 罷作病及服攻毒樂致血氣弱腿膝軟痿而死益 人枯腫痛足心發熱者皆因胎產經行失 经治草属 人換 可以負重涉險 主五

盛作渴或口舌生瘡亦用前二樂以滋化源大凡發 調 物芬連飲食少恐胸痞吐痰用二陳枳實黃連大便 哺熟内熱自汗盗汗等證皆陰虚假熱也故丹溪謂 為主佐以 以逍遥散脯熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯 九泉陰虚之極也男子酒色過度者多患此證 攝虧損足三陰虚熱所致若腫痛或出膿用六味 人素血虚因大势两足發熱峭熱月經過期或用 珍湯 胃虚賴食佐以六君子湯寒熱內熱 百 十 三 四

多少巴五百言

痛其熟如炙余以為足三陰虧損用補中益氣六味 欠定回复全等 **寬中消導之劑前症益甚更兼肢體酸痛服除濕化痰** 實吐疾無度足跟作痛余曰足熱明熱月經過期 夏脾胃漸健乃佐以六味九補脾腎不兩月而痊 血虚也的店吐族飲食少思脾胃氣虚也益胃為五脈 ·樂經候兩三月一至服通經降火之劑足跟足情 根本問無一 經候不調發熱賄熱胸膈不利飲食少思服清熱 虚諸病悉至先用補中益無如茯苓坐 政治準備 文 肝 护 胛

身瘙痒服風樂發熱抽搐肝脉洪數此肝家血虚 而生風以天竺膽星為九用四物麥門五味芩連 减 兩月諸盜漸退又用前湯并 一桅柴胡煎送而愈 ,勞則足跟熱痛余作陰血虚用八珍而愈痊後徧 如皴裂日晡至夜脹痛炊熱此屬足三 足跟患腫兩腿酸軟或赤或白或痛或痒或如無 味九及逍遥散 卷一百 加熟地川芎百餘劑而餘 八珍湯兩月而康 八兩足 一陰虚損 跟 /炎せ 用

多シリ

天王可奉合与 熱併作元氣不足嘔吐昏迷者難治急服五香湯活 飲勝金丹鳥金散選用壯實者 諸症悉愈 其色黄腫如琉璃多由行路崎嶇肭傷筋骨脉而成寒 或問足跟之旁生疽何如曰此名琉璃疽屬足太陽經 日晡熱甚余謂腎肝血虚用逍遥散六味九五十餘劑 心雕 澄治华绳 粒金丹或八陣散 幸


五靈散 病穿板又名穿窟天地屬少陰腎經虚損所致宜隔蒜 潰爛嘔逆迷悶脉微代者死 鬼道云兩脚心發徹骨者不治如脚心微皮破不至深 **炎之實者服活命飲送六味地黃九有表裏證量為 發膿不多者可治** 虚者十全人補湯八味地黄九天劑不問晨夜投之 赤梗 治病穿板亦治穿掌 金腦香 心發毒腫痛亦名涌泉疽俗 山蜈蚣 脱殼藤 紫金藤

たいしゅん とって

卷一百十三

又方 欠 足四車 台 肉 浸洗藥 敷穿板樂 右用地燈心桁樹根用醋蒸薰之併敷上 刺者生於足指問形如硬版與肉相附隱痛成刺 右水煎入酒 肉刺 滑來根衣爛縛之 仙人掌根水楊梅根二味砍爛縛之 赤梗紅花蜈蚣煎水洗浸之 超心华經 由

黄硫散 燕食膏 松脂膏 靴殺急军相摩而成 金グリ 右用松脂白膠香各一兩黄臘半兩火上鎔成膏 候冷方 贴用物紮定 砂盆內别磨皂角如糊和末敷之立効 右用蕪食子三枚肥皂角 11 17 治肉刺 治肉刺 治肉刺 卷一百十三 一挺燒今烟畫細研以職醋



證治準繩卷一百十三		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<b>本</b> 一百		
十三		卷一百十三
		-

子部

證治準鄉卷一百十四

許校官太醫院醫士臣舒 岱

編修臣倉聖脈覆勘 總校官進士 臣朱

助教臣 生 臣 徐 **小維吉** 

校 對

官

漢

腾

録

監

文已四年 上馬 CONT. CANAL **电路** (1000) C. Contract 腫無頭無面者俱是 不可以火針烙之 王肯堂 捑

腫勢盛表裏俱實者追疔奪命湯 金人口 用 性為末用麻油調搽即愈大効 此名病蛛用芙蓉葉搗酒炒縛爛者以蛛尾殼火煅存 惡寒發熱或頭疼或拘急宜表散之以荆防敗毒散 腫方淋洗以八仙膏解毒丸等樂堂之 金腦香葉田茶莉擂酒煖服以渣敷患處以汁刷患 以兩面龜散 尾尻骨處結毒如桃李之大紅赤焮痛不能行 若暴發赤腫切不可以針破只宜 紫游虚鸡用魚芭 無表裏證腫勢盛 若急切即

火足の車上島 方雷膝鼈尿藤根皮搗糟炒縛之又方魚苞子棒枯搗 |稜針亂刺去惡血以搭枯雷廷藤山樟子葉搗糟炒 之又用山雷廷滕赤牛膝山蘇木桦枯搗鹽糟炒縛 以追疗奪命湯加雞屎子雞距根 相紋之處結核腫痛但核形長如魚之狀名上水魚以 淬之泡湯乘熱淋洗之即消要服痱瘍樂 根煎水入酒和服又以水荔花葉赤子葉搗刷有熱者 赤痕如蝦之狀名病蝦證也用油炒鹽糟令香以熟湯 誰治準維 手背脚背腫大有 膝内臐近 又

|其疼方止此若以脚垂下其疼不可當也名曰倒抜腫 ]穢田肥株山樟子葉樟樹葉柏葉煎水入些酯洗之又 膏敷之却以九金六馬散服之 金銀皂角九 方只用柏葉一味煎水洗更速也要服苦參九蠟礬九 之狀其色白不痛但搔痒抓之起白死名曰蛇虱用油 糟炒縛之又方山雷廷根皮棒枯搗糟炒縛及用七聖 殤先用兩面龜一味煎酒服次服兩面龜散如不應以 脚背或脚趾腫痛不可忍以脚高懸起 遍身起如風疹疥丹

金以口及石門

卷一百十四

大三丁豆 醋煖刷之 煎水入酒和服 許和勻濾淨滴入耳中又服兩面龜散及以水坊子根 腦半分研与滴入耳中即効又用根磨薄荷湯入少酒 殤宜以金腦香根或葉搗爛入井水少許濾去渣入片 犀角磨酒服大劾 心蜈蚣小金錢豆辦草馬蹄草金鶯葉尾擂水入些 服又用金雞舌苦參青木香金鳳尾擂水入片腦少 1.4.7 紫遊風用紫茶根皮擂水刷又方加 耳中疼痛不可當者名曰腦裏虛 證治準備

附方 多分四月全書 两面龜散 痛加紫金藤馬蹄金鐵馬鞭 右水煎入酒和服 关蓉根山苧根川山蜈蚣 連义大青 山烏豆 两面龜 治 紫金皮 雞屎子 切腫瘍焮赤無名腫毒疼痛者 沿地雞胆 發熱加水坊根吉面消 **送一月十四** 脱殼藤 雞胆根 又方加白木待根山 魚桐根 詐死子 真珠 山淡豉 骨裏

欠足四年 白馬 雞屎子散 退熱消毒散 右水煎入酒和服 山烏豆 雞屎子 雞屎子 連义大青 大葉金凉傘 治虚瘍 **岩花子 紫金藤** 雞胆根 詐死子 治無名腫毒發熱者 落鴉爪藤 超治準細 水坊根 冬青根 大葉小青 金腦香 楊香根 臭木待 過山龍梗 吉面消 白根子

金いりせんとろい 退腫消核散 天花刮毒散 右為末用毛屎梯葉生地黄苦薄荷金腦香金鳳尾 為末并水調入些醋和媛刷患處夏月冷刷亦可 右簿荷煎服 地薄荷赤甍子尻池葉不拘二三味取葉擂米泔水 天花粉 艮脚根四紫金皮 黄檗各三南星 治一 治 切無名腫毒及結核赤腫者 切腫毒焮赤疼痛 樟柳根各 赤芍樂 薑黄的

九三日日 A M 又方 消腫刼毒散 丹卒腫起大痛羌青根大者杵之和苦酒如泥煮三 右末用米泔水調温刷 生赤樟柳根磨米泔調塗更妙 同刷亦妙 醋少許調勻煖刷 毛屎棉葉女雞屎子葉三 生樟柳根為末米泔水調温刷或以毛屎梯 治 一切無名腫毒虚瘍等毒 證治準經 又方單用艮脚一味為末以 五

再易孫真 傅之立効財後 金分正居石書 指著庭木痛不可忍十日後瘡日深漸馬大痛欲死 腫 帛上包之 根白汁傅之多塗立瘥余七月十五日夜左手中指背 頭指上 如泥再炒令焦以舊布如腫之大小攤之貼腫上勿 食忌 松外要臺 八葛 方 治 治 風毒腫三年苦酒濃煎蔥白以布包慰 切執毒腫商陸根和鹽少許傳之日 治惡刺及狐狸刺毒腫取蒲公英草 治腫蒺藜子一 切毒腫疼痛不可忍者搗萆麻 然一百十四 升炒黄杵細以香油 用

神 欠こりを 白芷水調傅尤妙 經患熱腫水研山豆根濃汁塗乾再塗 よじ 腫毒或疼痛處以赤小豆為末水調傳頻換或用香 劾 掛北簷下俟硝渗出矔外却牧之以人乳汁調半盞 而安 臘月中以新瓦雖滿注熱水用朴硝二升投湯中攬 切風熱毒氣攻注目臉及發頭面四肢腫痛應手 Lita I 又方白芙蓉葉晒乾同皂角為末 證治準編

水調傅 金分四月石書 治 處大灸皮鞋底熨之妙經驗 犀角飲 丹治諸處皮裹面痛何首烏末薑汁調膏以帛裹於痛 將絹帕子裹定旋挹所餘汁撲腫所四畔數撲之 右用黄蜀葵花子不拘多少研細滴水令稀稠得所 犀角 切亦腫但癰毒結未成者並可消 治諸風腫 鈫 亥參 連翹 柴胡去苗各 升麻

乞己可是 二十 熨風散 香 温服及夜食後各 右剉碎每服五錢七水 羌活 錢半芒硝用麥門冬去心各 甘草钱半 治諸瘡因風致腫 芫花 防風 炙各二 官桂分等 白芷 服利多即減 潜治华妇 一盏半煎至八分去渣食後 异茱萸 沉香 名犀角湯無槽 細辛 檀香 Ł 當歸 射

水澄膏 五岁四座 有書 蠶沙熨方 右為麤末作 勻炒令極熱帛裹於瘡上熨之稍冷即 上下痛止 晚蠶沙 相和炒熟布裹熨之冷即再炒各入醋少許尤 大黄 治熱腫痛大効 治風腫 鹽各不拘 南赤皮蔥連鬚細切半斤同職醋拌 鬱金 天南星 白发

2000 犀角湯 **唾潤之此樂除熟毒亦腫神効如皮膚白色者勿用** 底者去浮水以紙花子攤於腫焮處貼之如急燥津 右為細末每用新水一盞半藥末二錢攬調勻候澄 黄蜀葵花科 犀角绣木香线半連翹 石雕石直謂雅直腫硬如石 1.17 图 治石癰熱毒氣盛腫硬疼痛口乾煩悶 謹治非經 梔子仁 射干 當歸

黄連散 動定四库全書 夜疼痛宜用此消腫化毒止痛 服 右剉碎每服三錢水 黄雨炒 焰升麻 黄連 欁 竭 治石雞結硬發熱紫亦色毒氣攻衝未定日 青鹽各半赤 川大黄生白薇 7 玄纷 赤芍藥 卷一百十四 盏煎至六分去滓不拘時 馬牙硝 热合 枳殼妙甘草生各 黄檗 粒

欠已の事心馬 阿 大黄散 治石癰堅如石未作膿者 時温服以利為度 沙子機 炒 炒 湯 婦 湯 婦 右用生商陸根不拘多少 右剉碎分作三服每服水一盏煎至五分去滓不拘 右為細末蜜水調塗乾即易之 治石癰腫硬疼痛心腹煩悶不得宣暢 两川芒硝 芎藭各二 證治準絕 黑丘皮 生剉 枳殼去穰麩 半兩 兩 炒

金公正月 白重 沉香湯 卧 度及治濕漏諸瘡癤 温 右對碎每服四錢水 服 炒数獨 沉香 治石疽腫毒結硬口轧煩熱四肢拘急不 甘草 防風去木香錢半麥門冬去當 露羊角 角升麻 眪 卷一百十四 羊城人用此方取効者多 一盏半煎至七分去滓不拘 大黄当两炒 玄參 地骨皮 dr:

壞筋骨若毒散逐脉入臟殺人南人名為捐著毒厚肉 とこりをかり 單方治專去其熟取瘥其病喜著十指故與代指相似 根汁或飲藍青汁若犀角汁及升麻汁竹瀝黄龍湯諸 處即割去之亦焼鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲葵 應心根深至肌經久便四面悉腫炮黯熟紫黑色能爛 李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮腫痛傷之 瘭疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍栗極者如梅 瘭疽風 證治準編

治瘭疽秘方 黯疼痛入心是也 金片四月在書 不識之呼作代指不 急治之亦逐脉上入臟殺人南 納麝分三服蹇止不限劑數此方世所不傳神良 右十味㕮咀以水九升煮取三升下大黄 ·得之皆斬去其指初指頭先作顆泡後始腫亦黑 射干 兩 麝香分前胡分犀角六大黄 甘草 枳實 百十四 升麻 乾地黄 分 一沸去 黄芩

とこうら 射干散 去滓不拘時温服 右判碎入麝香令与每服四錢水 李腫痛不可忍 白薇 射干 麝香組研二前胡去蘆 /: 45 深 治瘭疽皮肉中忽生點子如麻豆大或如桃 枳實升麻松葉深師加黄苓麻 治瘭疽 川升麻 師 證治準紹 中盛煎至陸分 生用各 兩

多方四月全書 **滓入丹砂麝香末以柳箆攪勻甕盒盛傳患處日三** 先熬脂令沸次下諸樂煎候地黄赤黑色以綿紋去 右除丹砂麝香豬脂外剉碎以醋半斤和匀浸一宿 五上又取聚大以温酒調空心日午服一方温水調 下半匙 丹砂細射干 香 芎藭 分半研豬脂半一錢二猪脂二斤 黄芩去黑沉香 大黄炒犀角屑 卷一百十四 木香香 前胡蘆升麻 生地黄品

PANDER MADE 又方 治瘭疽諸疽十指頭焮赤痛痒 右三味合研令勻以水一丰煮三沸取汁洗日三四 右十一味㕮咀以水二丰先煮豬蹄一具取 藥取五升浸瘡即瘥 電屋塵 電突墨 金下土各 辛 白芷 藁本 當歸 大黄 芎藭 黄芩 證治準編 藜蘆 莽草科 方千金異名 黄連 甘草 一丰煮 細

治瘭疽者手足肩背忽發累累如赤豆剥之汁出者方 動好四母全書 又方 ヌカ 右 三味煎為膏傅之 度 鄉魚長三寸 熬蕪菁子搗碎布 亂髮灰服方寸 以麻子熬作末傳上良 以豬膽傅之良 一尾剧髮雞子豬脂升三寸儿髮雞子豬脂一 卷一百十 日三亦治發背 心轉傳上良

又方 とこうら 治疽溃後方 叉方 與鹽醬冬月研子水和服之 以鹽湯洗拭了燒皂夾灰粉上良 梁上塵和車虹中脂傳之 牛耳中垢傳之良 煮芸薹菜取 枸杞根并葵根葉煮汁煎令如糖隨意服之 以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出 Lita W 升服之并食丸熟芸臺數頓少 證治準編

治疽卒箸五指筋急不得屈伸者方 金分四月全書 治疽似癰而小有異膿如小豆汁今日去明日滿者方 芸薹熟擣濕布袋盛之埋熱灰中更互熨之不過再 **灸踝骨中央數十壯或三百壯** 三度安瘥冬用轧者 皂莢煎湯洗瘡拭氧以檗皮為末傳之勿令作 反花鸡品出者是

とこうえ 補 矣火其勢益甚或出血不止必致寒熱嘔吐等症須大 毒將盡塗之有効不然雖入而復潰若誤用刀針蝕樂 當滋肝補氣外塗藜蘆膏努內自入須候元氣漸復膿 胬肉突出如菌大小不同或出如蛇頭長短不一治法 薛翻花瘡者由瘡瘍潰後肝火血燥生風所致或瘡口 不然乃内用降火外用追蝕蝕而復翻翻而復蝕其肉 如菌余曰此屬肝經風熱血燥當清肝熱養肝血彼謂 脾胃為善 1.4.7 判官張承恩内股患癰將愈翻出一內 验治準編

蘆膏而痊 **遙散三十餘劑塗熬蘆膏而消又用八珍散倍用參**茂 黃九而尋愈 益大元氣益虚始信余言遂內用梔子清肝散外用藜 歸术而斂 消蝕割繫法屢去屢大此肝經血虚風熟余用加味逍 瘡 用清熱消毒之樂年餘未蹇余用補中益氣湯六味地 口翻張如菌焮連頭痛或胸脇作脹或內熱寒熱或 上舍素膏梁善怒耳下結一核從潰而 婦人素善怒臂患癰瘡口出肉長九上 男子背瘡斂如豆許翻出肉寸餘用

多定四庫全書

卷一百十四

欠己日日 白 一十餘劑諸症漸愈血止三四復因怒飲食頓少其血湧 熱風能散氣故耳仍用前散并八珍湯而愈 蘆膏而愈後因怒患處脹悶遍身汗出如雨此肝經風 熟自汗盜汗體倦食少余曰此屬足三陰虧損當滋化 三月餘矣肝脈弦洪緊實余用大補湯加麥門五味五 源不信反追蝕患處開勸六寸許峰嚴色亦日出鮮血 項患腫疾延涌甚用散堅行氣等劑腫硬愈甚喘氣發 證治準編 土 男子

許此肝脾鬱怒氣血虚而風内動用加味逍遙散塗藜

臙脂散 金月四周百章 出 **黎蘆膏** 加口 斂至寸許遂不用樂且不守禁而殁 此 蘆一味為末以生豬脂和研如膏塗患處周日易之 五味麥門其血頓止再以六味丸加五味子常服瘡 肝傷不能藏脾傷不能攝也用補中益氣湯為主 臙脂 研細先以温漿水洗拭後傳藥 治 治反花瘡 貝母 切瘡疽努內突出不問大小長短用 胡粉 寒一百十四 硼 砂 没藥各半

次定四車全書 四 諸瘡胬肉如蛇頭出數寸者硫黃末傳之即縮聖 惡實根塗傳方 成膏取塗瘡上日五次 右為細末以童子小便半盞以無灰火熬用竹篦攢 右調和如糊塗瘡上日三四次 惡實根肆兩豬脂 半炒磐石灰 人中白 治反花瘡 治反花瘡並諸瘡積年不瘥者 遊治準編 塞他僧两半 瘡

襲久則爛筋腐骨而脱出屬足三陰虧損之症也用補 梅治反花瘡馬齒莧一斤燒灰細研豬脂調傅 世瘡凸出寸許根如小豆或大如梅者用花脚蜘蛛 薛多骨疽者由瘡瘍久潰氣血不能管於患處卯氣陷 纏其根則漸乾 有內凸出烏梅燒灰為末傳之立盡鬼 細入蜜捏成餅如錢大貼之妙聖 多骨疽 卷一百十四 又以白梅肉

钦定四軍全書 题 歲月潰而出骨亦用前法若投以尅伐之劑復傷真氣 許午前畏寒午後發熱口氧唾痰小便頻數余以為足 自脱瘡自斂也夫腎主 骨若腎氣虧損其骨漸腫往苒 三陰虧損朝用補中益氣湯夕用六味九料加黄茂當 鮮有不誤者 消陰翳外以附子餅蔥熨法祛散寒邪補接榮氣則骨 舉人于廷器腿患流注年餘出腐骨心 1. 注網

中益氣湯以固根本若陰火發熱者佐以六味九壯水

之主以鎮陽光陽氣虚寒者佐以八味九益火之源以

處而痊 未愈肢體消瘦飲食難化手足並冷大便不通手足陰 冷余謂此陽氣虚寒用補中益氣湯八味丸仍炙其患 膏日服十全大補湯而愈 但數而無邪此氣血虛瘡結膿管而不能愈絍以鳥金 調補瘡口不斂日出清膿少許巳而常出三腐骨其脉 全大補之類喜其慎疾而愈 男子上腭腫硬年餘方潰內熱作渴肢體 上舍王廷璋患前症三 儒者患腐骨疽失於 年

歸五味子各三十餘劑外用豆豉餅諸症漸愈又以十

骨 人已日三 八十万 州 用十全大補湯六味地黃九各五十餘劑元氣漸復患 骨露出形體消瘦盗汗不止發熱口舌乾燥天真已喪 飲外數寒凉腐潰而至十六瘡口開張足背漫腫黯黑 補湯六味地黄九各五十餘劑而愈不然多變瘵症或 歲足問腫黯潰而露骨體瘦盜汗發熟口乹用十全大 瀝盡氣血而亡 塊仍服前藥諸症悉去瘡口亦飲 男子自十四歲閃足腫痛服流氣 避治準編 男子十六

消瘦六脉洪大左手尤甚用補中益氣湯六味九出腐

時毒者為四時邪毒之氣感之於人也其候發於鼻面 朝 處漸赤脱落骨 症漸愈瘡出腐骨仍服前藥前後共三百餘劑得愈 内熱脯熱自汗盜汗經水兩月一 十餘素弱左手背漸腫二年後潰出清膿腫黯連臂 用歸牌湯夕用逍遙散腫處頻用蔥熨法兩月餘諸 目城亦腫痛重則咽喉頭項亦腫或漫腫無頭或結 時症 **地又各五十餘劑始愈** 至此肝脾氣血虧損 婦 年

金月四月五書

卷一百十四

とこうも 附塞醫人不識謂之傷寒便服解熱之劑一二日間 食不知味者必死之候治之無功矣然此疾有陰有陽 也五日以前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面益腫 勢益増始知樂誤原夫此疾古無方論初發狀如傷寒 有可汗有可下粗工不識但云軌毒八用寒凉之樂殊 五七日間乃能殺人若能延至十日之外者不治自愈 知病有微甚治有逆從不可不審也 · - - 5 N. 经治准编 친 腫

核有根令人憎寒發執頭痛或肢體痛恍忽不寧咽喉

實而不解者散之以举連敗毒散 次用十神散 之以五利大黃湯 通聖消毒散 在表也用葛根牛蒡子湯解毒升麻湯升麻牛蒡子散 湯 類以發之 腫甚焮痛者砭去惡血更用消毒以普濟消毒飲 脉沉濇者邪氣入深也宜漏蘆湯大黃湯 表裏俱解而不消者和之以劫瘴消毒 頭面耳項亦腫作痛咽乾發熱脉浮數 脉沉實而便秘者邪氣在裹也宜梔子 表果俱實而不解者解表攻果以 卷一百十四 東實而不利者下

金厅四月全書

作渴脉實便秘者以五利大黄湯次以追疗奪命湯又 久己日戶 AI 1 實者先宜砭去惡血次以洗煙散洗之消腫散刷之却 次以水邊嫩桕根水煎入酒和服 次以苓連消毒散又次以七神散 腫脹痛作渴寒熱便秘脉數按之尤實以通聖消毒散 以苓連敗毒散次以退熱消毒飲又次以七神散 以蛇不見根同白梅搗傳牙斷含去涎初服追疔奪命 以黄芪败毒散次以劫瘴消毒散七神散 難治準綱 腫勢已盛大熱脉 腫痛發熱脉浮數 腫痛發熱

染其病人亦每日用嚏藥三五次以泄熟毒此治時毒 出腹者治之必愈左右之人每日用嚏藥搐之必不傳 内搐通氣散取十餘嚏作効搐樂不嚏者不可治如嚏 數或洪數者不可托之以宜消之以烏苞子根水煎服 滑而數乃瘀血欲作膿也以托裹消毒散潰之若脉浮 湯次服七神散萬病解毒九 又方以谷藤根水煎服及用祛瘴散服之 經三四日不解者不可大下猶宜和解 表犯已解腫尚不退脉 又宜於算

多分四屋 有書

為腫此感四時不正之氣也與膏梁積熟之證不同硝 赤者可服托裹散黄茂散 黄之劑非大便秘實不可用若不審其因及辨其虛實 身半巳下腫地之氣也乃邪客心肺之間上攻頭目而 **葛根牛蒡子湯四劑而痊經云身半巳上腫天之氣也** 敷 が在表尚未解用荆防敗毒散二劑勢退大半更以 犀角連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起髙 發表| 人頭面腫痛服硝黄敗毒之劑愈甚診之脉浮

**人已日早上島** 

撥治準繩

毒散二劑勢減半又二劑而痊 患之乃是胃氣有損邪氣從之不可不察 咽乾發熱脉浮數先以荆防敗毒散二劑勢退大半又 飲食難下不得安卧醫砭腫上四五十針腫赤不减痛 耳前後尤甚痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠點 以葛根牛蒡子湯四劑而痊 發寒熱脈浮數以荆防敗毒散二劑少愈再用人參敗 一人冬月病頭面赤 一人耳面赤腫作痛 一人腫痛 腫

金月已尼石雪~ □

表裏縣用攻之必致有悞常見饑饉之際芻蕘之人多

卷一百十四

**夕已四事公馬** 故寒所謂寒緻腠理以苦發之以辛散之方名 又云冬月閉藏用藥多少針石也宜以苦温之劑温 絡熟不得升聚而赤腫且夫天令寒凛之時腠理閉汗 盆甚予診其脉浮緊按之洪緩知為寒覆皮毛髒遏經 托裹温經湯 不出血氣强肉堅治善用針者不得取四厥必待天温 7.車 ALAS W W N A E 白 正 當歸根 中 解 肌 出 汗 專 治 白 正 當歸麻黃 去 根 節 二 錢 防 風 去 蘆 二 錢 上 當帚事血流不行去 進二銭升麻苦辛 當歸身川痛二 經

金山人でたる丁 郭氏升麻牛蒡子散 樂同煎至一盞去渣温服服記以簿衣覆首厚被覆 悉愈經言汗之則瘡已信哉 腫減七八分再服去麻黄防風加連翹鼠黏子腫痛 身卧煖處使經血温腠理開寒乃散陽氣升大汗出 右剉每服一兩水二盞先煎麻黄令沸去沫再下餘 人參去舊甘草出白芍樂酸微寒調中益氣使托散滯各二錢倉木雄壯能泄膚腠間濕熟一錢年温以和血倉木温熟則腫着木甘温體輕浮力 治時毒瘡疹脉浮洪在表者瘡

久已日年 ALS 又方 右㕮咀薑三片水二盛作 發於頭面胸膈之際 麻黄谷 麻黄 白芷 升麻 升麻 治時毒 牛蒡子炒甘草 荆芥 連翹 赤芍 連翹二 监禁 乾葛 牛蒡子 融治準編 青木香 桔梗 服 桔梗 金銀花 甘草 葛根 玄參 圭 防風 玄琴

葛根牛蒡湯 **苓連敗毒散** 金月口月月 右生薑薄荷煎服 右簿荷煎服 草 防風 活 牛蒡子 柴胡 乾葛 青木香 荆芥 升麻 治時毒腫痛而便利調和者 治時毒腫痛發熱左脉浮數者 前胡 黄連 赤芍藥 發熱無汗加麻黃 川芎 黄芩 金銀花 桔梗 連翹 藍葉 羌活 白芷 玄參 中 獨

返魂丹 九己日戶 ANS 右水煎服 右為末酒煮麵糊九如胡椒大每服二九蔥白 嚼爛裹九温酒吞下 葛根 銅青 人患此腫痛 治時毒瘴氣疔瘡惡瘡 貫衆 雄黄 乳香 血蝎 没樂 誰治學經 國老豆豉 作渴脉實便閉以五利大黃 黄丹 輕粉 穿山甲炮白礬 蟾酥錢 二十四 根

表散樂愈熾發熱便秘診脉沉實此邪在裹也以大黄 湯下之諸證悉退以葛根牛蒡子湯四劑而痊 漏蘆湯 尚存更以托裹樂潰之而愈 金牙口唇有書 下之裹症悉退以葛根牛蒡子湯浮腫亦消惟亦腫 有臟腑積熱發為腫毒疙瘩一 漏蘆 芳子 治時毒頭面紅腫咽喉閉塞水樂不下治素 女参 升麻 桔梗 大黄 卷一百十四 黄芩 連翹 切腫傷惡瘡便實者 甘草 青木香 藍葉 苦參

加減解毒丸 五利大黄湯 大効 蟻毒蜂蠆毒菌狐毒惡瘡毒可以磨服可以磨塗大 解砒霜毒光粉毒鼠莽毒惡蛇毒惡犬毒蜈蚣毒白 右薄荷煎服 右簿荷煎服 大黄 加連翹玄參大青甘草名梔子仁湯 黄芩 治時毒疔瘡瘴氣癰疽發背無名腫毒 治時毒焮赤腫痛煩渴便秘脉實 升麻 梔子 芒硝

**火三四戶 在手** 

ī

證治準繩

孟

金片正月有書 効如神 右為末秫米粉煮糊杵搗為九印作錠子陰乾每服 米泔水磨塗或用芙蓉葉搗汁磨塗更妙 此樂要端午七夕重陽日或選天德月德日德天醫 日最佳合時要淨室焚香至誠修製勿令孝婦雞犬 錠井花水磨化服冬月薄荷湯磨化服 麝香試續隨子去殼 五倍子四山炎站四大戟 碌砂 凡修合 切腫毒

とこり見 かき 消毒九 右為粗末每服二錢水煎腫熟甚如芒硝二錢半 時毒疙瘩漏蘆散 右為細末煉蜜九彈子大新水化下一丸無時內加 瘩頭 面洪腫 咽嗌堵塞水樂不下一切危惡疫厲 見之効驗不可具述 漏蘆 大黄 治時毒疙瘩惡證 升麻 牡蠣 白僵蠶炒各 大黄 治臟腑積熟發為腫毒時毒疙 證治準繩 黄芩 藍葉 テナ 玄参名二

實用防風通聖散 前藥不應者毒血凝聚上部經絡藥力難達故也惡血 患處出黑血仍投前藥即應又以荆防敗毒散而瘳益 甚便秘脉實此表裏俱實也飲防風通聖散不應遂砭 來牛等黄芩二劑 而差 動分四母全書 既去其樂自効或拘時寒遠寒及年鳥畏用硝黄而用 發表攻裏一人 焮腫 脹痛作渴煩熱便秘脉數按之尤 桔梗黍粘子湯尤妙 **劑諸證頻退以荆防敗毒散加玄** |老冬月頭面耳項俱腫痛

芒硝 欠己可戶 在時 防風通聖散 不危矣 後胃氣虧損者須當審察非大滿大實不用 防風 翘 簿荷 當歸 治時毒熱毒便秘熱燥若時 麻黄 川芎 各二钱甘草 齊或不 砭 泄其毒專假藥力 超治準 桔梗 石膏 下两滑石 黄芩鸡 Ē 硝 連 备

金月口月月 通聖消毒散 半表半裏中和湯 右水煎服或為末白湯調下仍量人虚實 右簿荷煎服 滑石 玄參 麻黄 防風 蓝葉 大黄 梔子 荆芥 1 治時毒腫痛表裹俱實者 大便利去大黄朴硝 連翹 甘草 朴硝 青木香 治時毒脉浮在半表半裏者 卷一百十四 赤芍樂 牛蒡子 黄連 į 黄檗 川芎 當歸鬚 桔梗 石膏 黄芩

火足四年 四馬 法托裹以防邪毒之内侵作内托復煎散一劑終日 内托 之兩日而平 在表也以平昔胃氣有損不可用發表之劑宜服潔古 右㕮咀每服一两水煎 按此出足太陽陽明例樂也 荆芥 菖蒲 婦頭面俱亦腫焮痛甚盛其脉浮數此形證俱 麥門冬 牛蒡子 前胡 證治準經 川芎 甘草各等 羌活 防風 チ 漏蘆 飲

内托復煎散見前通 一級翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰 縣丞亦得此證至五六月醫以承氣湯加藍根下之稍 寒體重次傅面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾 身半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客 李明之存心於醫可以請治遂命診視具説其由曰夫 内消泰和年東垣監納濟源稅時長夏多疫癘初覺憎 燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不救張

火已四年 上馬 速去反損除也此却為客邪當急去之是治客以急也 高分瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所苦不 |喘以為佐新升麻柴胡苦平行後急者謂前緩劑已經 甘草甘寒瀉火補氣以為臣連翹鼠黏子薄荷葉苦辛 實熟是誅伐無過殊不知適其病所為故遂處方用黃 於心肺之間上攻頭而為腫盛以承氣下之瀉胃中之 平板監根味甘寒馬屁勃白僵蠶味苦平散腫消毒定 連黃本味若寒瀉心肺間熱以為君橘紅玄參若寒生 斑治準網 芫

|或酒浸或煨又以鼠黏子新瓦上炒香㕮咀煎去渣納 者出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黄苓黃連 甘草通炒過對煎少少不住服呷之或服畢再用大黄 之此治急以客也 主當緩也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主 若急治之不惟不能解其紛而反致其亂矣此所以治 且治主當緩者調陽邪在上陰邪在下各為本家病也 也陰分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者當急去 假令少陽陽明之為病少陽為邪

金月でたろう

たこり声 芒硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微利及邪氣 举連消毒飲 也 防風荆芥之類選而加之並舉上藥均合不可獨用散 湯陽明行經加升麻葛根芍藥之類太陽行經加羌活 利邪已即止如陽明渴者加石膏少陽渴者加瓜蔓根 セス 飲子見雜病頭痛門 服前樂如不已再服後樂依前次第用之取大便 坦方名普濟消毒 防風 Ashin To 荆芥 治時毒發熱惡寒頭項腫痛脉洪數 連翹 證治準網 柴胡 黄芩 川芎 丰

金月四月全書 托裹消毒散四劑膿成針之而愈 作膿亦以前藥潰之愈 黄之劑攻之稍緩翌日復痛診之外邪已退亦瘀血 血作膿也以托裏消毒散潰之而愈 和 、禁衛一 右薄荷煎服 連 活 婦表邪已解腫尚不消診之脉滑而數乃疾 甘草 桔梗 藍葉 青木香 卷一百十四 射干 人表裏俱解惟腫不消 金銀花 白芷 少军李蒲汀用 婦腫痛用硝 牛蒡子 欲 黃

中益氣加桔梗及托裹消毒散而愈 九三日年 二丁 柴胡升麻炙甘草以升舉陽氣用牛蒡玄參連翹桔梗 氣素弱脉微細而伏此形病俱虚也用參未芎歸陳皮 散之藥耗損元氣患處不消體倦惡寒食少口乾用補 以解熱毒二劑腫頓消而脉亦復矣前以脉微細為屬 君 腫赤不消食少體倦膿清色白乃脾肺氣虛也先用六 隂以腫赤為屬陽而樂之鮮有不誤者 加桔梗芎歸後用益氣湯加桔梗而斂 經治準編 秋官陳同野元 婦人潰後

金月四月 **一陽氣羨襲或因營氣不從逆於肉理或因腠理不塞外** 薛流注之證或因飲食勞倦脾胃傷損或因房勞陰虚 邪客之或暴怒傷肝或鬱結傷脾或濕痰流注或跌撲 摇鼻迎氣散 右為末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏為度一日二次 頭 流注 白重 藜蘆 豬牙皂角 治時毒燥腫咽喉不利取嚏以泄其毒 羊躑躅花 川芳谷 北細辛 草烏

成者自消已成者自溃若久而不斂佐以豆豉餅琥珀 散腐化之經云形傷痛氣傷腫又曰真氣奪則虚邪氣 凉尅代其不死者幸耳 盛則實若不補氣血節飲食慎起居戒七情而專用寒 虧損所致悉宜葱熨及用益氣養榮湯固其元氣則未 こうこ 血滞或産後惡露皆因氣血疑滯而成也或生於四肢 關節或生於胸腹腰臋或結塊或漫腫或作痛皆元氣 **祛散寒邪補接陽氣若內有腹管而不斂者用針** 1. . . 澄治準繩 黄不串流者俗曰馬旗串 三十二 頣

馬旗此證因風熱走散四肢治當疎風散熱初起不 熱者名曰殺著馬旗若髁骨下痛甚無堆但腫者名曰 甚名曰嗍骨馬疾若遍身骨節内疼痛不能起坐無堆 者名曰走散流注俗曰瓜藤馬旗外形微腫骨節内疼 用火針烙之腫勢盛者只宜刺以稜針久熟者可火針 作熱不退者亦曰嗍骨馬旗若脊骨及髀骨上起琟或 一二个或三五个名曰過脊馬琪若尾骶骨上起堆作 脚馬旗若骨相交接之處疼痛無堆微腫名曰接骨 可

卸定四库全書

少思宜健胖除濕六君子湯加芎歸黄茂白芍肉桂 參敗毒散次以小柴胡合二陳湯加羌活川芎枳殼當 とこうこ 氣 歸白术 烙之流注入股者死 濕執凝滯內理而致者但腫一塊不痛肉色不變飲食 不劔者益氣血宜人參養榮湯十全大補湯 飲 腫硬作痛者行氣和血宜瘡科流氣飲 抑鬱所致而不痛者宜調經脉補氣血益氣養 ? ? ; 暴怒所致胸膈不利者調氣為主宜方脉流 -傷寒餘邪未盡者和解之以人 證治準編 141 脾氣虛 溃而

散宜榮衛返魂湯加乾葛升麻紫蘇川芎獨活薑水煎 骨痛或遍身痛宜温經絡養氣血宜大防風湯及五積 次以二陳合四物加香附烏藥桔梗 湯加黄芪羌活杜仲 散合敗毒散加川牛膝杜仲或獨活寄生湯次以四物 金分四母子書 服 閃肭瘀血疑滞為患者和氣血調經絡宜方脉流氣飲 接骨馬蕻用穿山蜈蚣白田柯石楠藤山良薑九節 如無潮熱用榮衛返魂湯加獨活酒水各半煎 病尚有潮熱者裹有寒邪未盡 卷一百十四 寒邪所襲筋攣

· 大巴司巨 公言 |楠藤白田柯溪楓根九節香對節金驚煎水淋洗却服 紫金藤紅內消馬蹄香馬蹄藤煎酒服 紫金鍾紫金皮紫河車天南星磨醋煖逢又用紫金皮 脚散九金六馬散 香紫金皮含笑葉煎水時時熱淋洗之却服續骨散九 根紫金皮搗爛鹽糟炒縛又以煎水熱淋洗之却服輕 野芋子根馬藍草養蘆子紫河車山枇杷根皮山布瓜 金六馬散 起堆核數枚但小些名馬疗又名馬鈴用 7 嗍骨馬旗用穿山蜈蚣紫金皮石 进治準組 鎖脚馬旗用 季四

**藩根白芙蓉葉凌霄根皮溪楓根皮亦毛桃根皮搗爛** 山布 每分正母 有重 半泔半醋調煖刷渣封瓜藤馬旗並効却服蠲脊散九 子根天銅柯普營子根皮亦毛桃根皮亦芎根皮搗爛 金六馬散 杷根皮湬蘆子小樟子根皮天門冬天南星仙人掌根 嗍骨散九金六馬散四味浸酒方 根紫金皮紫金鍾落鴇鎗根七葉楊香天花粉真珠 瓜根赤牛膝半夏凌霄根皮佛桑花馬藍草野芋 瓜藤馬獲用山布瓜根多赤葛子根皮樟 過脊馬旗用山桃

**夕正司事公** 葛合根石萍搗懶醋調刷道封用洗腫方淋洗却以 散四味浸酒方又用洗腫方熟淋之 金六馬散蠲骶散服之 河車山枇杷根皮黎蘆子山布瓜根凌霄根皮佛桑 根皮搗爛酒炒縛之此方馬與並大効却服九金六馬 白田柯搗爛鹽糟炒縛之又方山布瓜根紫金皮溪楓 鞭穢紫金皮山枇杷根皮凌霄根皮佛桑花落鴉館根 鹽糟炒縛之又方山布瓜根葛合根紫河車黎蘆子馬 證治準網 諸馬琪有熱者用去熱散 殺者馬旗用紫 丰五

梗积殼而愈 潰爛者即係潰瘍宜查本門治之 金月日月月 治驗一 已出膿其熱亦不能退要五個盡出膿熱方退也 裹者用追疔奪命湯却用水金鳳搗爛縛核堆上即劾 表者用判防敗毒散有裹者用內球黃連湯有表復有 其熟即退若生堆核四五個只一二個未成膿餘者皆 馬旗有熟未成服藥即能退之若已成者但要出膿 人因怒脇下作痛以小柴胡對四物加青皮桔 人醫腫 卷一百十四 **塊微痛脉弦紫以瘡科** 

え・う! 然先用前湯二劑更服黑九子而痊此二患若失治潰 用大防風湯 般桔梗而愈 方脉流氣飲二劑而腫消更以二陳對四物加香附 桔梗貝母數劑頓退更以小柴胡二十餘劑而痊 遲以方脉流氣飲數劑少愈以小柴胡對二陳加青皮 因閃肭肩患腫遍身作痛以黑丸子二服而痛止 1.1. 7 劑頻退又二劑而安 婦腿患筋攣骨痛諸藥不應脉運緊 人因怒肠下腫痛胸膈不利脉 超治準網 又 一婦患之亦 美

氣飲四劑而消

對 作敗症 用人參養榮湯及附子餅灸更以補劑煎膏貼之兩月 餘愈 少思半載不潰先以六君子加芎歸芍藥二十餘劑飲 敗毒反發熱少食用四七湯數劑胸寬氣利以小柴胡 食漸進更以豆豉餅日灸數壯服前樂再加黄茂內桂 四物加香附陳皮腫痛亦退 餘劑膿熟針去以十全大補湯及附子餅灸之月 人脾氣素弱臂腫一塊不痛肉色不變飲食 婦稟弱性躁脇臂腫痛陷膈痞滿服流氣 人腿患溃而不敛

多定四库全書

卷一百十四

内塞散一料少愈以十全大補湯及附子餅灸而愈 苦歸數劑飲食少進再用補劑月餘而消 **处己可臣 !!!** 法世俗論也以其為病痞滿壅塞似難為補殊不知正 謂氣無補法乃服方脉流氣飲愈虚始用六君子湯加 益氣湯加半夏茯苓枳殼木香飲之以香附餅熨之彼 餘 氣虚不能運行則邪氣滯而為病不用補法氣何由 而愈 人臂腫筋攣骨痛年餘方潰不斂診脉更虚以 人腿腫肉色不變不痛脉浮而滑以補中 超治準經 **夫氣無補** Ē

弱 此乃命門火東不能生土以致脾虚而然也遂以八味 精要云留積經久極陰生陽寒化為熱以此潰多成瘻 金分口周分書 久而不斂飲大補藥及附子餅以針頭散紅之而愈 患處熨之月餘膿成針之仍服前藥而愈 作膿飲食少思强食則脹或作瀉日漸消瘦診脈微 宜早服内塞散排之 凡 飲食漸進腫患亦消 以益氣養榮湯間服黑丸子及木香生地黄作餅 人腿腫一 百十四 人背解患之微腫形勞氣 塊經年不消且不 人腿患 ř 細

人已日日 八十万日 甚悴脉愈虚先以六君子加芎歸月餘飲食漸進以 脈浮大而濇乃氣血俱損須多服生氣血之劑庶可保 全彼謂火尚未盡乃用凉樂內服外敷幾危求治其形 子餅而廖 子餅灸兩月餘膿成針之更服人參養榮湯半載而愈 胡地骨皮牡丹皮月餘寒熱少止再用益氣養榮湯附 人臂患年餘尚硬飲食少思朝寒暮熟八珍湯加柴 婦膿潰清稀脉弱惡寒久而不愈服內塞散灸附 人臂患出腐骨三塊尚不斂發熱作渴 證治準絕

脇 珍湯加肉桂三十餘劑瘡色乃赤更以十全大補湯 薑桂胃氣復而惡症退乃去乾薑加黃茂數劑微赤微 後胃氣頓虚始信余言遂用四君子加芎歸酒炒芍藥 則痛全口此當補 二陳羌活川芎歸术枳殼數劑而消 附子餅僅年而差 熱以人參敗毒散二劑熟止灸香附餅又小柴胡 下近腹肝膽經部分結一塊四寸許漫腫不赤按之 脾胃彼謂腫瘍宜表散乃服流氣飲 老傷寒表邪未盡股內患腫 侍御朱東溪左

金万

T

四分重

张一月十四

とこの重 寒熱予診其氣血俱虚彼反服表散之劑果發大熱亦 潰按之微痛脉微而濇此形證俱虚當補不當寫乃用 益氣湯加減八味丸而愈 如常不潰發熱予欲治以益氣養榮解鬱之劑彼却別 餅十全大補湯百劑而愈 服流氣飲後針破出水年餘而殁又一 人参養榮湯及熱义慰患處膿成以火針刺之用豆改 痛又三十餘劑焮腫大痛此膿内潰也遂針之用補中 1. 15 超治準繩 男子肠腫一塊日久不 婦腰間患一小塊肉色 婦久不飲忽發 . 三九

金月四月白書 **剩先通經果腹疼泄不止遍身浮腫飲食少沒於木旺** 日萌發執予日此脾土氣血虚也用養脾滋氣血樂飲 稜莲术厚朴之類飲食少四肢微腫無腰腫 之月 食進則浮腫自消 殁 解鬱養氣血彼反服辛香流氣之劑致腹脹又服 人元氣素弱患此胸膈不利飲食少思予欲健 婦經不調兩月或三月一至四肢腫飲食少 血氧充則經水自調彼以為緩用 小腹腫硬通年成瘡頭破時 塊不潰

反己可戶 ALT 图 一潰乃陽氣虚弱嘔吐少食乃胃氣虚寒法當温補脾 患此腫硬不潰脉弱時嘔欲用敗毒等藥余謂腫硬不 血水此七情所傷營氣逆于肉理也名曰流注診之 日熟而脉反静脱血脉反實汗後脉反躁者皆為逆也 服攻伐之樂氣血愈虚果殁于金旺之月 乃可予欲以甘温之藥補其氣血令自消潰彼不信 脉濇益肝病脉不宜濇小腹正屬肝經須濇屬金脉退 不信仍用攻伐而嘔愈甚復請治脉微弱而發熱余 誰治準絕 男子腹

解不治後果殁 金分正月有書 瘡科流氣飲 或胸膈痞悶或風寒濕毒摶於經絡或血不和結成 腫塊肉色不變或漫腫木悶無頭或陰發嚴乳等 未成速散已成速潰敗膿自出惡肉自去非常之 桔梗 檳榔 厚朴養白芍藥 人參 南木香 治陰發流注恚怒氣結堆核腫硬作痛 當歸 紫蘇 川芎 肉桂 烏樂 白芷 甘草 防風 黄芪鹽水 驗 證

とこうら 敗毒流氣飲 為膿學者知之 此乃行氣散血之劑若服之過度則氣血虚耗何 滯加香附 此樂疎邪流氣 母 右生薑煎服 羌活 瘡不乾加炒皂角刺 1. A. T. 獨活 治流注初發堆核硬痛不可忍者宜用 胃虚加陳皮 疼痛加乳香没藥 青木香 納治準絕 赤芍薬 流注加羌活獨活 不乾加知母 當歸 1+6 氣 貝

多分四月全書 方脉流氣飲 黄芪 急咳嗽痰盛或面目四肢浮腫大小便秘者 右生薑生地黃煎服 走注疼痛或心胸痞悶脇腹脹滿嘔吐不食上氣喘 陳皮 川芎 青皮 香附 桔梗 治陰發流注瘰癧及鬱結腫聚結塊或 紫胡 白芷 白芍藥 然一百十四 熱加大黃黃芩 半夏薑赤茯苓 三棱 當歸 達我茂 白茯苓 虚加人 甘草 枳殼

去執散 包三日豆 二十 血滞加肉桂 右生薑煎服 此行氣耗血之劑不過二三劑止之不可多服 通加木通梔子 吉面消 風 桔梗炒半夏薑黄芪炒川芎 治馬痒發熱者此樂退熱腫瘍亦効 南木香 H. 山烏豆 嘔吐加藿香 流注加羌活獨活白芷稍 大腹皮 浮腫加豬苓澤瀉 證治準繩 雞屎子 甘草 瘰癧加夏枯草 雞胆根 枳實炒陳皮 檳榔 氣滞加香附 甲二 枳殼 小便不 防

動坑四周分重 九金六馬散 右水煎服 腫瘍乳癰脇癰便毒頭風風核等發者 過山龍 紫金皮 鐵馬鞭 ተተ 金星草 臭木待根連义大青 金凉伞大 金鶴根 治馬旗流注馬瘽馬面馬腿馬挪癰疽 金凉傘根金腦香 白馬骨 華白根子 金銀花 地馬梢 落稿瓜藤 紫金藤 山烏豆 紫金藤 山紅花根馬蹄 九牛 雞屎子 馬蹄藤 金

三馬散 久已日日 から 散血消核湯 右水煎入酒和服 右水煎入酒和服 雞屎子 紫金皮 白馬骨 毛裏金釞 治馬旗 馬蹄香 赤牛膝 大薊根 治馬旗 水滚子根穿山蜈蚣 證治準綱 穿山蜈蚣 馬蹄金 山蘇木 馬蹄藤 溪楓根 野 鐵馬鞭 山鳥豆

浸酒方 立效散 金月四周全書 右水煎入酒和服或合六馬散亦効 右水煎入少酒和服 馬蹄金 老公鬚根毛裏金釵根狗骨子根大葉毛吹曲 水液子根又名溪椒根又淡茶樂根中晚祥西根 冶馬旗 治馬旗 鐵馬鞭 撥雪根

續骨散 大三日巨 白 輕脚散 右浸酒煖服不可煎 右酒水各半煎服 鐵馬鞭 天燈心 馬蹄香 天燈心 治接骨馬旗 治鎖脚馬旗 紫草 臭木待 馬蹄金 紫背草 赤牛膝 證治準經 酒蟬子根 紫金皮 赤牛膝 山蘇木 天花粉 鈎藤根 釣鈎藤 日十四 白馬骨

金分四月日書 嗍骨散 右酒水各半煎服 鐵馬鞭 馬蹄金 酒欙根 根鳥道子根穿山蜈蚣 蚁 治嗍骨馬旗 馬蹄藤 地茄根 酒壜根 白馬骨 卷一百十 紫金藤 馬蹄香 馬蹄金 白馬骨 李子根 鐵馬鞭 紫金皮 天燈心 釣鈎藤 穿山蜈

蠲骶散 とこうえ 蠲脊散 右生地黄酒水各半煎服 右水酒各半煎服 鐵馬鞭 溪楓根 紫背草 紫金皮 1.1. 治殺著馬旗 治過眷馬旗 臭木待根 狗骨根 白田柯 天燈心 強治準婦 地茄根 酒爆根 赤牛藤 馬蹄香 山蘇木 白馬骨 四十五 撥雪 白馬骨 蚠

退創散 動定四庫全書 右水酒各半煎服 右水煎入酒和服 馬蹄金 屎子 根穿山蜈蚣 對節金鶴根 地馬梢根 治馬與滿身創人轉動不便 詐死子 金腦香 白馬骨 馬蹄金 馬蹄藤 一百十四 鐵馬鞭 山茄根 馬蹄香 頭形花根 狗骨根 地馬梢 雞

馬鞭散 とこり 巨 とこう 釣鉤縣散 右水煎入酒和服又用雪裹開搗糟炒縛之又用樟 右水煎入酒和服 鐵馬鞭 石楠滕 釣鈎藤 狗骨子根 治馬隍 治馬旗腫瘍病後筋脉拘急 伸筋藤 鬼腰带根 凉藤子 真珠簏根 證治準經 脱祥西 石楠藤 雪裏開 羊帶歸根 豨薟草根 H 馬蹄 燈

金月四月分書 妙草散 一妙散 右搗爛糟炒縛之又用秦椒酒煎 右搗糟炒縛之叉用七層樓煎酒服之 白根子 馬蹄香 根皮山枇杷根皮搗糟炒縛之 楊梅竆 治病馬瘦 治滿身起堆是馬旗 香圓橘葉 赤芎根皮 卷一万十四

九三日戶 A 馬 樂不効應後結毒一是酸醋酸斂邪毒後結廣癬 類須用土茯苓對停服毒勢既殺八珍十全大補湯之 虚损感邪穢之氣而成或因下疳畜毒纏綿不已而作 **邗毒淺几患此證先宜食毒物以發之後服通聖散之** 花瘡此則邪毒盛細小者名廣豆或如赤根膿窠此則 名翻花瘡肉反於外狀如蠟色有如綿花故又名綿 以補氣血必守禁忌方獲全愈大忌房勞如犯之服 鞍治準編

或問廣瘡何如曰此肝腎二經濕熱或色慾太過腎經

毒筋骨疼痛來去不定亦名濕毒筋骨痛酸乍作乍止 筋骨疼痛結成風塊或一二年或數年方發其狀堅硬 宜隨其淺深治之先服消風散毒後服補劑瘡勢盛及 名干層癬多生手心足底重疊不已又有餘毒亦名氣 肉色平淡或痛或痒多結於骨節頭面喉鼻之間經絡 白腸能發鬱火以致纏綿不已一忌輕粉及冷水致後 金月四月百里 結毒深者必用熏藥後服通聖散以泄火毒後服八 交會之處已破則膿水淋漓甚可畏也輕則發廣癬亦

脉沉數形在臟腑也先用內球黃連湯通導之後用換 大百日日 四 痛熱毒熾盛也瘡微作痛毒將殺也瘡色白而不結亦 散之脉弦數邪在肝膽經也先用龍膽瀉肝湯清解之 痛者初起脉浮數邪在脾肺經也先用荆防敗毒散解 故多在下體發起有先筋骨痛而後患者有先患而後 肌消毒散為主愈後再無筋骨疼痛之患若瘡凸亦作 湯大補湯之類弱者不宜熏恐不能勝火氣也 元氣不足邪氣所乗亦有傳染而患受症在肝腎二經 證治準維 醉屬

作痒重墜肝經陰虚濕熱也小便頻數短少色亦肝經 作痒膀胱陰虚也陰器間或股内痒肝經血虚也陰囊 陽氣虚也色亦而不結亦陰血虚也搔痒脉虚浮氣 金分正月百十 少思口乾飲湯胃氣虚也飲食難化大便不實脾氣虚 捶變赤外邪相搏也眉間痒或毛落 肝膽血燥也飲食 陰虚也小便頻數色白短少脾肺氣虚也面目搔痒或 也侵最或夜間泄瀉脾腎虚也若治失其法有蝕傷眼 相禁也搔痒脉浮數血不能相禁也獨背間或頭間

而痊 表症乃退以仙方活命飲六劑瘡漸愈無萆薢湯月餘 表實者宜先解表 者若惧用輕粉等劑反為難治 とこりう 者補氣血 解表攻裹 六味九以生腎水蠲痺解毒飲以養血祛邪亦有可愈 目腐爛玉莝拳攣肢體者但用九味蘆薈九以清肝火 ... to 婦焮痛發熱便秘作渴脉沉實以內疎黃連 表虚者補氣 人遍身皆患左手脉數以荆防敗毒散 東實者宜先政東 验治準繩 裹虚者補血 濕勝者宜先導濕 表裹若俱實 四九 表裏俱虚

熱所致先以導水九進五服次以龍膽瀉肝湯數劑再 而愈 身突腫狀如翻花筋攣骨痛至夜尤甚此肝腎二經濕 单解湯月餘而痊 除濕健脾之樂外貼神異膏吸其腹隔蒜灸拔其毒 氣虚者四君子 |劑裹症已退以龍膽瀉肝湯數剛瘡毒頓退間 服輕粉等樂反次毒于内以致选發 若表實者荆防敗毒散 如 人下部生疳諸藥不應延及遍 虚者四物仍加無症之藥並愈 裏實者防風通聖散 槩服防風 朖

動定四峰全書

卷一百十四

次三四年全等 零 毒散無龍膽瀉肝湯而痊 **熱作渴便秘兩手脉實用防風通聖散而退以荆防敗** 通聖則氣血愈虚因而不治者多矣 小柴胡湯吞蘆薈九更貼神異膏月餘而痊 **瀉肝湯導水九各四劑少愈再以小柴胡加黄檗蒼木** 五十餘劑而平 而座 小柴胡加木通青皮龍膽草四劑又龍膽瀉肝湯數 童玉堃患之延及小腹数枚作痛發熱以 人玉堃腫潰小便赤溢肝脉弦數 超治準維 人患之腫痛先以龍膽 人患之發寒 D 1 愈

能起居以滑石黄檗為末菉豆粉等分鋪席上令可卧 兩月餘而痊 少思以六君子湯加當歸藿香三十餘劑更飲萆薢 其上更貼神異膏反服黑九子并托裹藥兩月而愈 後腿腫一塊久而潰爛不斂以蒜搗爛傅患處以艾灸 更以金銀花散月餘而痊 硬肉色不變年餘方潰出水三載不愈氣血俱虛飲食 婦然輕粉樂於被中熏之致過身皮揭膿水淋漓不 人患之勢熾無脾胃氣血皆虚亦服 一人皆愈但背腫一 一塊甚

火足四年 在馬 每日以蒜搗爛塗患處灸良久隨貼膏樂數日稍可却 淋漓少食不睡久而不愈以八珍湯加茯神酸聚仁服 掌無防學骨痛三載不愈諸樂不應朝晡熱甚飲食少 用豆豉灸更服十全大補湯而愈 思以草蘇湯無逍遙散倍用白术茯苓數劑熱止食進 前樂而蹇 痊 貼神與膏更服八珍湯加牛膝杜仲木瓜三十餘劑而 人楊梅瘡後兩腿一臂各潰二寸許一穴膿水 婦患之皆愈惟兩腿兩膁各爛一塊如 遊治準網 凡有腫硬或作痛 五十

佐以换肌消毒散而愈 大便不實左尺洪數左關弦數右關浮緩按之微弦余 **乾膿窠誤服祛風等藥股體倦怠惡寒發熟飲食漸減** 證先王並作痒出水後陰囊股內小腹肠臂發小瘟或 亦用蒜灸及數中和骨內服補藥並効 弦 而虚熱傳於肝也右關脉浮緩脾胃之氣弱也按之 日此患屬肝膽經也左關脉弦左尺脉浮數者腎水少 ,者肝木乘脾土也用六味地黄丸補中益氣湯為主 儒者患前症色焮赤作痛 儒者患前 而

金人でんろう

火二日日 1.15 作痛右關脉洪數而虚此脾胃受傷而火動用清胃散 大便秘而不實服祛風敗毒等樂舌痛口乾脉浮而數 祛風消毒之藥復傷元氣因勞役過度内熱口乾齒 此邪氣去而陰虚所致用六味九料加山絕當歸四劑 作痛股體倦怠惡寒發熱脉浮而虚此元氣復傷而邪 脉症頓退又用八珍湯加山梔丹皮瘡色漸白後用四 氣實也用補中益氣湯二劑而痊 君加歸芪而愈 患者服攻毒等樂患處凸而色赤 證治準編 儒者患之誤服 五 鼥

臟弱而虚火動也先用六君子二十餘劑又用補中 頭面臂陽各結一塊二寸許潰而形氣消弱寒熱口乾 氣加山茱萸山藥麥門五味服之胃氣復而諸症愈惟 舌燥唇裂小便淋漓痰涎上湧飲食少思此脾胃傷諸 之類而愈 風邪所傷先用荆防敗毒散加萆薢釣鉤藤敷劑漸 小便未清痰涎未止用加減八味九而痊 )頭面搔痒或成粒或成片或出水脾肺脉俱洪數此 進士劉華甫患之數月用輕粉硃砂等藥 儒者患 愈 益

金月四月月

勞役飲酒後則遍身生瘡服祛風敗毒之劑面目胸背 為主佐以調理之劑两月餘血氣復而瘡愈 敷當歸膏內服補陰八珍加单辭五錢并換肌消毒散 熱往來作渴痰壅此濕熱壅盛元氣虛而不能愈也外 とこすこ 後遍身捶痒内熱口乾佐以六味九而痊 但口乾内熱用四物加山梔釣藤金銀花甘草節而 加轧葛釣鈎藤各一錢二十餘劑諸症漸退仍以前藥 協結 **塊如桃栗凹凸痒痛膿水淋漓氣血虚甚寒** <u>}</u> 雅治準維 商人 毎 愈

銀分四庫全書 换肌消毒散 单解湯 右水煎服 每服貳兩水三鍾煎 久者以此一味為主而加以無證之劑 白鮮皮 土茯苓或當歸港白芷 俗呼冷飯團 木瓜不犯木通 治時瘡不拘初起潰爛 鍾半去渣徐徐温服病甚患 皂角刺 金銀花谷七天甘草

とこり早か 翻毒换肌飲 羅庫消毒散 右以長流水肆大碗入砂鍋內煎至三碗 右水煎服 薑黃 赤芍藥或白芷五 黃瓜黛 冷飯團白色者木槌 土茯苓 治楊梅瘡 治時瘡肢節拘攣 獨活路五白术 證治準維 黄茂鹽水炒 三錢 白芍藥 五四 入後樂 五分 當歸

又方 多分四月百書 右再煎至一大椀通口頓服胃弱者分為二服日三 花粉 钱各半-已上各 木瓜 分體風胡麻炒研金銀花 木瓜 粉草節 穿山甲 胡麻 蘆生地黄 白芷 五加皮 皂角刺 風藤 當歸 白芷 豬胰子切碎 甘草節錢 白鮮皮 天花 金銀花 粉 貝 兩 地骨皮 母 į 漢防已 貝 母 服

夕已日 年 公時 洗湯方 時各 河水三大椀入砂鍋内煎至一大椀空心上下午飢 二壹分錢 五倍子四皮硝一地骨皮三两甘草一两五 打冷飯團 葱枝1 服忌食茶醋牛肉河鲢豬肝腸 柴胡五獨核肥皂子 四兩白色者可 用木槌打碎 證治準備 豬胰子" 七個般 切碎白鮮 两五 五十五 皂角子 個七

金片口尼白電 梅瘡丸樂方 白花蛇酥火露蜂 味同搗極爛洗淨點上 真輕粉五杏仁 米熱熏洗旋添熱湯浴至汗出為度浴時先服前 服 鍋勿侵生水先以

包記日本 即光矣 共五味入羊肉内煎至一大椀空心服其羊肉任意 多用 用黄米飯為九日進二三服好酒送下七日後 不可 細茶各五孩兒茶 芎 龜板 當加樺皮灰 大黄 酥炙雄黄 用雄羊肉一斤水八椀煮熟入後藥 蟬 證治準繩 蜕 展砂各五分 飛丹錢 麻黄 槐花米 五十八 两前

動好四周分書 圍棄す **鹹水調**圍 食之葢被取汗天明洗浴 黄連 丁香 霜 亦治結毒 黄蠟谷 檀香 錢雄黃受蘆甘石 龍骨五水片 兩二 沉香 乳香錢五 只用 赤石脂型 貼立効 韶粉 白

重法 P. 13.21 有劾 香油煎膏 銀膏贴之次日又洗又熏之半月有効如重二十日 右四味為末入艾拌勻用黄紙做成藥筒五寸長以 能愈者用此法熏之極妙能收輕粉毒 火燒著一 好文葉一斤雄黄一黄丹而松香两倉木出製過 治楊梅瘡毒流注四肢或偏身結成大瘡久不 1.4. 頭將煙熏瘡口待筒燒過一半去筒用水 原方有樟腦三錢恐作痛故去之 設治準編

水銀膏 一金 好四庫全書 洗樂方 右日日煎湯洗之 右研極細和勻用桐油調成膏油紙攤作隔紙膏貼 之其油紙先用黃連黃檗煎湯刷 地骨皮 無名異 石菖蒲 亦治臁瘡 荆芥 何首烏 水銀 防風 銀硃 甘草 羌活 黄丹 百草霜谷等 獨活 然後難貼 金銀藤

大きりる **送血虚四物之類** 黃連湯或敗毒散愈後服单解湯有熱加冷連氣虚參 **垢口出穢涎為驗連擦三日煎通里散澡洗更服內疎** 久再塗樂少許仍前再擦用樂畫即卧汗出或大便去 無風處取樂少許塗兩脚心以兩手心對脚心探磨良 又提法 白礬末并水銀各三錢半入香油津唾各少許和勻坐 ?. · · · · · · 治楊梅瘡不問新舊並効不過旬日用膽礬 键治准编

金竹四母全書 繩卷一百十四 Transfer a state a reserve of the state of t Designation of the